Normolip 5 Forte

CAMPO DE ACCIÓN

Producto indicado en caso de dislipidemias. Normolip 5 Forte con una compleja acción sinérgica disminuye los niveles de colesterol (c-Total y c-LDL) y triglicéridos y contribuye a reducir el riesgo cardiovascular asociado (el ácido fólico contribuye al metabolismo normal de la homocisteína). Es útil tanto en personas con hipercolesterolemia familiar como para aquellas personas que ven incrementados los niveles de lípidos en sangre a causa de malos hábitos dietéticos.

PRESENTACIÓN

Caja de 36 comprimidos en blíster

MODO DE USO

1 comprimido al día, preferiblemente por la noche antes de acostarse.

NO CONTIENE

Gluten, lactosa, derivados lácteos, OGM.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños. / No superar la dosis diaria recomendada. / El producto no debe considerarse como un sustituto de una dieta variada. / No aconsejado durante el embarazo o lactancia, menores de 18 años o mayores de 70 sin el control de un profesional de la salud. / En caso de estar en tratamiento con anticoagulantes consultar al profesional de la salud. / No aconsejado en caso de estar en tratamiento con fármacos para el colesterol o con otros productos naturales que contengan Arroz rojo fermentado.

APTO VEGETARIANOS Y VEGANOS

CON CARDO MARIANO

500 MG BERBERINA

1 AL DÍA



SIN GLUTEN · SIN LACTOSA · SIN DERIVADOS LÁCTEOS · SIN OGM

COMPONENTES	POR COMPRIMIDO	ACCIÓN	EFECTO
BERBERIS (Berberis aristata DC), raíz y corteza de las ramas e.s tit. 85% berberina clorhidrato	588 mg	Hipolipemiante Antidiabética Antiinflamatoria Antioxidante	Aumenta la expresión de un gen que codifica la síntesis de la proteína LDLR, proteína receptora de LDL-colesterol. Esta proteína actúa en la membrana celular, principalmente de los hepatocitos, como receptor del LDL-colesterol, captando moléculas de LDL-colesterol e introduciéndolas en la célula. De este modo, las células del hígado retiran el "colesterol malo" (c-LDL) de la circulación general y disminuyen su nivel en sangre, mejorando el riesgo cardiovascular. Incrementa los niveles de HDL.
CARDO MARIANO, fruto e.s tit. 80% silimarina	100 mg	Hepatoprotectora, hipolipemiante, antioxidante,	Modifica la estructura celular externa de los hepatocitos impidiendo la penetración de los agentes hepatotóxicos dentro de las células; además estimula la actividad de la polimerasa A de los nucleolos, con el consiguiente aumento de la síntesis proteica ribosomal, lo que estimula la capacidad de regeneración del hígado y la producción de nuevos hepatocitos.
ARROZ ROJO FERMENTADO, e.s tit. 5% monacolinas totales (2,9mg)	58 mg	Hipocolesterolemiante	La monacolina K es un profármaco que se hidroliza en el organismo y se transforma en ácido mevinolínico, que es un análogo estructural del 3-hidroxi-metil-glutarilo (HMG), por lo que se une a la enzima HMG-CoA reductasa, bloqueando el paso del HMG a ácido mevalónico, y en consecuencia inhibe la síntesis endógena de colesterol en una de sus primeras fases.
COENZIMA Q10 (ubiquinona)	10 mg	Antioxidante / producción de ATP	Es esencial para la producción de energía en la mitocondria de las células. Es responsable del 95 % de la producción energética del organismo. Impide la aparición de los efectos secundarios asociados a las estatinas. Es un importante antioxidante.
POLICOSANOLES, e.s. tit. 60% octacosanol	10 mg	Hipolipemiante / antioxidante / antiagregante plaquetaria	Disminuye la síntesis de colesterol, incrementa la actividad de los receptores LDL, la unión de las LDL al receptor, la internalización y su catabolismo. Mejora la circulación sanguínea y reduce la absorción del colesterol exógeno.
ÁCIDO FÓLICO	200 mcg	Metabolismo de la homocisteína	La homocisteína, un aminoácido sulfurado que se origina en el metabolismo de la metionina, es una molécula muy agresiva para el endotelio arterial. Numerosos estudios sugieren que el exceso de homocisteína plasmática se asocia a un riesgo aumentado de enfermedad coronaria, vascular cerebral y periférica. La causa principal de exceso de homocisteína plasmática es el déficit de ácido fólico.
PICOLINATO DE CROMO	40 mcg	Metabolismo de la glucosa	Forma parte del FTG (factor de tolerancia a la glucosa). Su función es favorecer la acción de la insulina, es decir, permitir la entrada de la glucosa en la célula, para su combustión. Además, influye en el metabolismo de las proteínas y de los lípidos.

Otros componentes: agente de carga: celulosa microcristalina, fosfato dicalcico y carboximetilcelulosa sódica reticulada: agente de revestimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, ácidos grasos, celulosa microcristalina: agente anti aglomerante: sales de magnesio de los ácidos grasos y bióxido de silicio.

COMPLEMENTOS

®NORMOLIP 5 FORTE

1 AL DÍA

CON BERBERINA (500 mg)



Normolip 5 Forte con una compleja acción sinérgica mejora el perfil lipídico y disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular.




C-TOTAL	C-LDL	C-HDL	TG
↓	↓	↑	↓
DISMINUYE EL RIESGO CARDIOVASCULAR	TIENE ACCIÓN HEPATOPROTECTORA		MEJORA EL PERFIL GLUCÉMICO

- ✓ Resulta una alternativa natural y eficaz a las estatinas que no presenta los efectos secundarios de estas.
- ✓ Puede ser utilizado a largo plazo
- ✓ Sin riesgo de toxicidad hepática, ni renal.


BERBERINA (Berberis aristata DC)


CARDO MARIANO


MONACOLINA K



COENZIMA Q10


POLICOSANOLES


ÁCIDO FÓLICO


PICOLINATO DE CROMO

¿POR QUÉ NOMORLIP 5 FORTE?

- ✓ Acción sinérgica
- ✓ Alta concentración de Berberina
- ✓ Disminuye Colesterol (c-Total y c-LDL) y triglicéridos
- ✓ Actúa sobre el colesterol endógeno y exógeno
- ✓ Controla los niveles de Homocisteína
- ✓ Disminuye el riesgo de arteriosclerosis y el riesgo cardiovascular
- ✓ Con Coenzima Q10 y Cromo

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

- ✓ Niveles de c-Total superior a 200mg/dl o de c-LDL superior a 100mg/dl y/o niveles de triglicéridos superior a 150mg/dl.
- ✓ Persona que no está en tratamiento con Estatinas
- ✓ Personas con hipercolesterolemia familiar y personas que ven incrementados los niveles de lípidos en sangre a casusa de malos hábitos dietéticos.
- ✓ Personas con mala tolerancia a los tratamientos farmacológicos hipolipemiantes habituales y cuando las medidas dietéticas no logran un adecuado control del colesterol.
- ✓ Persona que presenten riesgo de Síndrome metabólico (sobrepeso/obesidad con exceso de grasa en zona abdominal)